

Инструкция рассмотрена и одобрена на Совете по ветеринарным препаратам «20» декабря 2017 г. Протокол № 93.

ИНСТРУКЦИЯ по применению препарата ветеринарного «ТОЛУТРОКС 5%»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Толутрокс 5% (Tolutroxum 5%).

1.2 Толутрокс 5% представляет собой жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета.

В 1,0 мл препарата содержится 50 мг толтразурила.

1.3 Препарат выпускают по 100, 250, 500 и 1000 мл в полимерных флаконах.

1.4 Препарат хранят с предосторожностью (список Б) в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от плюс 2 °С до плюс 25 °С.

Срок годности – 2 (два) года от даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Толтразурил, входящий в состав препарата, относится к группе триазин триона. Толтразурил активен в отношении *Iso spor a suis*, *Eimeria arloingi*, *Eimeria scabra*, *Eimeria guevarai*, *Eimeria bovis*, *Eimeria zuernii*, *Eimeria alabamensis* и других видов эймерий, паразитирующих у поросят, ягнят, козлят, телят, кроликов и щенков на стадиях их эндогенного развития.

2.2 Толтразурил оказывает повреждающее действие на митохондрии и процессы деления ядра эймерий, нарушая процесс формирования макрогаметоцитов.

2.3 После перорального введения толтразурил медленно всасывается в желудочно-кишечном тракте и оказывает противоэймериозное действие на слизистой и подслизистой оболочках.

Выводится толтразурил из организма в основном в неизменном виде, а также в виде метаболитов с фекалиями и частично с мочой.

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

3.1 Толутрокс 5% применяют поросятам, ягнятам, козлятам, телятам, кроликам и щенкам с лечебной и лечебно-профилактической целью при эймериозе.

3.2 Толутрокс 5% применяют перорально индивидуально в следующих дозах:

- поросятам с 3-дневного возраста: 0,4 мл/кг массы тела, но не менее 0,5 мл и не более 2 мл/животное, однократно;

- телятам с 5-дневного возраста: 3 мл/10 кг массы животного, однократно;

- ягнятам и козлятам с 2-недельного возраста: 4 мл/10 кг массы животного, однократно;

- кроликам с 4-недельного возраста: 0,14 мл/кг массы животного, однократно;

- щенкам собак с 12-дневного возраста: 0,2 мл/кг массы животного 1 раз в день в течение 3 дней.

3.3 При передозировке препарата у животных может наблюдаться снижение аппетита, уменьшение потребления воды и потеря массы.

3.4 Побочных явлений и осложнений у животных при применении препарата в рекомендуемых дозах, как правило, не наблюдается. В редких случаях возможны аллергические реакции.

При развитии аллергических реакций животным назначают антигистаминные и симптоматические лекарственные средства.

3.5 Убой поросят на мясо разрешается не ранее, чем через 91 сутки; ягнят, козлят,

телят и кроликов – не ранее, чем через 70 суток после применения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, используют для кормления плотоядных животных.

4 МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1 При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.

4.2 Упаковку из-под препарата запрещено использовать для бытовых целей.

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ




5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного или несоответствии препарата по внешнему виду, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, составляется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (г. Минск, ул. Красная, 19^а) для подтверждения соответствия препарата нормативной документации.

6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 ООО «Промветсервис»

220034, Республика Беларусь, г. Минск, ул. З. Бядули, 12/2а
тел/факс (017) 503-53-67

Инструкция подготовлена сотрудниками кафедр фармакологии и токсикологии (И.А. Ятусевич, Т.Н. Смаглей), паразитологии и инвазионных болезней (А.И. Ятусевич, И.П. Захарченко, Ю.А. Бородин) УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» и ООО «Промветсервис» (М.А. Степанюга)

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь	
Совет по ветеринарным препаратам	
ОДОБРЕНО	
Председатель	
Секретарь	
Эксперт	
20. 12 2017г. протокол № 93	